

*Spazio riservato al timbro che
indica l'approvazione del testo*

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Anagrelid Nordic

Che cos'è Anagrelid Nordic e quando si usa?

Anagrelid Nordic in pillole è utilizzato per il trattamento della trombocitemia essenziale e contiene un principio attivo denominato anagrelide. In presenza di questa malattia il midollo osseo produce più trombociti del necessario e il numero molto elevato di tali trombociti può determinare gravi disturbi circolatori. Con Anagrelid Nordic è possibile prevenire la comparsa di questi problemi, in quanto il medicamento impedisce la proliferazione eccessiva di trombociti. Inoltre, Anagrelid Nordic inibisce anche l'agglomerazione dei trombociti.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Anagrelid Nordic?

Se manifesta reazioni di ipersensibilità al principio attivo anagrelide o a una delle sue sostanze ausiliarie (tra cui il lattosio (zucchero di latte) e la cellulosa microcristallina), non può assumere il medicamento. Anagrelid Nordic non può essere assunto nemmeno in caso di gravi malattie cardiache, di problemi epatici e renali da moderati a gravi, così come durante una gravidanza o l'allattamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Anagrelid Nordic?

Nel caso in cui soffra o abbia sofferto di disturbi della funzione epatica o renale o di una malattia cardiaca, il suo medico deciderà se può assumere Anagrelid Nordic.

Informi il suo medico se soffre dalla nascita o ha precedenti familiari di prolungamento dell'intervallo QT (visibile nell'elettrocardiogramma), se assume altri medicinali che causano variazioni anomale all'elettrocardiogramma oppure se ha valori bassi di elettroliti (ad es. potassio, magnesio, calcio).

Il medico controllerà i suoi valori ematici prima di iniziare la terapia con Anagrelid Nordic e, in seguito, a intervalli regolari durante la stessa.

I medicinali che contengono sucralfato per il trattamento delle ulcere gastroduodenali possono compromettere l'assorbimento di Anagrelid Nordic nell'organismo. In combinazione con acido acetilsalicilico sussiste un aumento del rischio di forti emorragie.

Nel caso di comparsa di emorragie, per es. della pelle, oppure di vomito di sangue o di feci picee, occorre informare immediatamente il medico curante.

Informi il suo medico se assume uno dei seguenti medicinali:

- medicinali contro i disturbi del ritmo cardiaco, ad es. sotalolo, amiodarone;
- fluvoxamina, utilizzata per il trattamento delle depressioni;
- medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiache, come ad es. milrinone, enoximone, amrinone, olprinone e cilostazolo;
- acido acetilsalicilico, una sostanza presente in molti antidolorifici e medicinali utilizzati per abbassare la febbre, nonché per prevenire la formazione di coaguli di sangue (fluidificanti del sangue);
- altri medicinali utilizzati per il trattamento di malattie che influiscono sulle piastrine nel sangue (fluidificanti del sangue), ad es. clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Nel caso di comparsa di emorragie, come nuove emorragie della pelle (ad es. lividi), vomito di sangue e feci picee (feci di colore nero) occorre informare immediatamente il medico curante;
- omeprazolo, utilizzato per ridurre la quantità di acidi che si forma nello stomaco.

Contraccettivi orali («pillola»): se sviluppa una grave diarrea mentre assume questo medicinale, ciò può compromettere l'affidabilità del contraccettivo orale; si raccomanda pertanto l'uso di un ulteriore metodo contraccettivo (ad es. profilattico). A questo proposito, legga anche l'informazione destinata ai pazienti della «pillola» che lei sta assumendo.

Durante il trattamento con Anagrelid Nordic, deve assumere la dose esatta prescritta dal suo medico. Non interrompa o riduca l'assunzione di Anagrelid Nordic senza prima parlarne con il suo medico. Non deve interrompere o ridurre improvvisamente l'assunzione di questo medicinale di propria iniziativa, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di complicazioni trombotiche, come ad es. l'ictus, che possono potenzialmente essere fatali.

I segni e i sintomi di ictus (infarto cerebrale) possono includere intorpidimento o debolezza improvvisa del viso, del braccio o della gamba, specialmente su un lato del corpo, confusione improvvisa, difficoltà a parlare o difficoltà a capire i discorsi, improvvisa difficoltà a vedere in uno o entrambi gli occhi, problemi improvvisi di deambulazione, vertigini, perdita di equilibrio o mancanza di coordinazione e improvviso forte di testa senza causa nota. Si rivolga immediatamente a un medico.

Quando si sospende o si interrompe Anagrelid Nordic, il numero di piastrine nel sangue ricomincia ad aumentare entro quattro giorni dall'interruzione, raggiungendo o addirittura superando i valori precedenti al trattamento entro 10–14 giorni, con nuovi rischi di disturbi della circolazione. Pertanto, è necessario effettuare controlli regolari.

Anagrelid Nordic contiene lattosio: Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Non sono noti effetti di Anagrelid Nordic su attività che richiedono la massima attenzione. A causa dei possibili effetti collaterali (ad es. vertigini e nausea), è richiesta prudenza durante la conduzione di un veicolo o l'utilizzo di macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Anagrelid Nordic durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o se sta cercando una gravidanza, non può assumere Anagrelid Nordic. Per le donne che sono in età fertile è raccomandato l'uso di un anticoncezionale adeguato.

Anagrelid Nordic non può essere utilizzato durante l'allattamento.

Come usare Anagrelid Nordic?

Prenda Anagrelid Nordic attenendosi esattamente alla posologia indicata dal suo medico. In caso di dubbi consulti il suo medico o il suo farmacista. Se non diversamente prescritto dal suo medico, la dose iniziale raccomandata è di 0.5–1.0 mg al giorno. Tale dose deve essere mantenuta per almeno una settimana. Dopo una settimana la dose può essere definita in base al singolo caso, per raggiungere il dosaggio ottimale. L'aumento della dose giornaliera non deve superare 0.5 mg la settimana.

Non deve essere assunta una dose superiore a 5 mg/giorno. La singola dose non deve superare 2.5 mg. Se la dose giornaliera ottimale lo consente, Anagrelid Nordic deve essere preso in dosi parziali 2x al giorno (ogni 12 ore) oppure 3x al giorno (ogni 8 ore), in questo modo l'assunzione di cibo non avrà alcuna conseguenza sull'efficacia di Anagrelid Nordic.

L'assunzione di Anagrelid Nordic implica una terapia continuativa. I risultati della terapia devono essere controllati regolarmente.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se ha dimenticato di prendere Anagrelid Nordic, non deve compensare la dimenticanza con l'assunzione di una dose doppia. La dose consueta prescritta deve essere assunta all'orario consueto. Informi il medico curante della mancata assunzione.

Se ha assunto una dose eccessiva, si rivolga subito al suo medico o al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Non smetta di assumere Anagrelid Nordic senza aver prima consultato il suo medico. Una decisione autonoma di sospendere l'assunzione di Anagrelid Nordic può causare gravi complicazioni (cfr. «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Anagrelid Nordic?»).

Nei pazienti anziani si utilizza il dosaggio normale definito per gli adulti.

Le esperienze con Anagrelid Nordic nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni sono molto limitate.

Quali effetti collaterali può avere Anagrelid Nordic?

L'assunzione di Anagrelid Nordic può comportare i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Mal di testa.

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Stanchezza, senso di vertigine, battito cardiaco più veloce del solito, batticuore, formicolio alle mani o ai piedi, gonfiore delle mani e dei piedi, anemia, ipertensione, mal di schiena, nausea, diarrea, disturbi digestivi, insonnia, emorragie cutanee di piccole dimensioni, epistassi, eruzioni cutanee.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Ematomi, sanguinamenti, secchezza delle fauci, difficoltà respiratorie o dolori quando si respira, dolori, riduzione della funzione cardiaca, aritmia cardiaca, svenimento, infezioni delle vie respiratorie, dolori articolari e muscolari, vomito, flatulenza, stitichezza, dolori addominali, debolezza, nervosismo, ronzii nelle orecchie, disturbi visivi, congiuntivite, infezioni delle vie urinarie, insufficienza renale, calo delle piastrine, aumento di peso, depressione, emicrania, ridotta sensibilità della pelle al contatto e alla pressione (ipoestesia), caduta dei capelli, prurito, aumento della pressione nelle arterie polmonari (tra i segni rientrano: affanno, gonfiore a gambe o caviglie e possibile colorazione bluastra di labbra e pelle).

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Fibrillazione atriale, infarto cardiaco, angina pectoris, insufficienza cardiaca, spasmi dolorosi delle arterie del cuore (a riposo, solitamente di notte o la mattina presto; cosiddetta «angina di Prinzmetal»), caduta della pressione mentre ci si alza, accumulo di liquidi nella pleura, polmonite, asma, colorazione alterata della pelle, gastrite, inappetenza, aumento dello stimolo alla minzione notturna, malessere, brividi e sintomi influenzali.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)

Gravi aritmie cardiache (come le torsades des pointes)

Singoli casi

Fibrosi polmonare, nefrite.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Ictus dopo una sospensione improvvisa del trattamento.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Le pillole non devono essere utilizzate, se presentano alterazioni del colore, crepe in superficie o perdita di rigidità.

Indicazione di stoccaggio

Conservare le pillole a temperatura ambiente (15 - 25 °C). Conservare il contenitore nel suo cartone per tenere il contenuto al riparo dalla luce.

Anagrelid Nordic in pillole deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Consegnare il medicinale non completamente consumato, ad es. al termine della terapia o in caso di scadenza, al suo farmacista per lo smaltimento.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Anagrelid Nordic?

Principi attivi

Pillole contenenti 0.5 mg, 0.75 mg o 1.0 mg di anagrelide come anagrelide cloridrato monoidrato.

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina (E460), Lattosio, Crospovidone (E1202), Povidone K30 (E1202), Magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

66150 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Anagrelid Nordic? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Anagrelid Nordic è reperibile con i dosaggi e nelle confezioni di seguito indicati:

0.5 mg in confezioni da 50 e 100 pillole (con scanalatura).

0.75 mg e 1.0 mg nella confezione da 100 pillole (con scanalatura).

Titolare dell'omologazione

Nordic Pharma GmbH, Zürich.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).